

kogusaak tõusis 1933. a. 9 490 000 kv-le eelmise aasta 7 827 887 kv. vastu, suurenedes 21,2%. Parema saagi põhjustasid kasvutingimused. Harilikult on küll Põhja-Eestis kartulisaagid paremad kui Lõuna-Eestis, kuid 1933. a. osutus kartulisaak paremaks Kesk-Eestis. Keskmise saak ha-lt 13 882 kg eelmise aasta 11 686 kv. vastu, tõus 18,8%.

Söödajuurikate kasvatamine on üldse veel vähe levinud ja näitab langust. Möödunud aastal langes söödajuurikate kasvupind 2,4% võrra, vähenedes 7640 ha-le eelm. aasta 7827 ha-lt. Juurviljakasvatus on levinud kõige rohkem Kesk-Eestis piimakarjapidamise valdkonnas. Keskmise juurvilja-saak ha-lt oli Viljandimaal 27 080 kg, Petserimaal 14 043 kg ja Võrumaal 14 040 kg. Juurvilja kogusaak oli 1933. a. 1 538 820 kv. l. a. 1 697 346 kv. ja 1925.—1929. a. keskmise 1 260 627 kv. vastu. Mullusele saagile avaldas halvavat mõju suvine põud.

Juurvilja kasvupind ja saak:

| | K a r t u l | | | S ö ö d a j u u r i k a d | | |
|------------|----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|
| | kasvupind ha | kogusaak kvintaalides | keskmiselt kg ha-lt | kasvupind ha | kogusaak kvintaalides | keskmiselt kg ha-lt |
| 1933 . . . | 68 367 | 9 490 440 | 13 882 | 7 640 | 1 538 820 | 20 142 |
| 1932 . . . | 66 984 | 7 827 887 | 11 686 | 7 827 | 1 697 346 | 21 686 |
| 1931 . . . | 67 810 | 8 545 316 | 12 602 | 8 118 | 1 678 421 | 20 675 |
| 1930 . . . | 68 039 | 8 631 100 | 12 686 | 8 073 | 1 632 000 | 20 216 |
| 1925—29 | 67 219 | 7 143 506 | 10 627 | 6 514 | 1 260 627 | 19 352 |
| | % (1925—1929 = 100). | | | | | |
| 1933 . . . | 101,7 | 132,9 | 130,6 | 117,3 | 122,1 | 104,1 |
| 1932 . . . | 99,7 | 109,6 | 110,0 | 120,2 | 134,6 | 112,1 |
| 1931 . . . | 100,9 | 119,6 | 118,6 | 124,6 | 133,1 | 106,8 |
| 1930 . . . | 101,2 | 120,8 | 119,4 | 123,9 | 129,5 | 104,5 |