

Aritmogramm-tabel XXIX.

Variation annuelle de la fréquence des nuages Ci (Cirrus simple, Cirrus fibreux, Cirrus réunis en couches, Cirrus en bandes). Chaque „—“ indique 5 enregistrements.

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|------|
| | | | $\frac{2}{-}$ | $\frac{1}{-}$ | $\frac{2}{-}$ | $\frac{4}{-}$ | $\frac{1}{-}$ | | | | | |
| $\frac{-}{-}$ | $\frac{3}{-}$ | $\frac{4}{-}$ | $\frac{-}{-}$ | $\frac{-}{-}$ | $\frac{-}{-}$ | $\frac{-}{-}$ | $\frac{-}{-}$ | $\frac{-}{-}$ | $\frac{4}{-}$ | $\frac{3}{-}$ | 3 | |
| 10 | 8 | 9 | 27 | 26 | 22 | 19 | 21 | 10 | 9 | 8 | 3 | 1922 |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 8 | 5 | 6 | 2 | 13 | 17 | 24 | 20 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1924 |
| $\frac{3}{-}$ | — | $\frac{1}{-}$ | 2 | $\frac{-}{3}$ | $\frac{-}{2}$ | $\frac{-}{-}$ | $\frac{-}{-}$ | $\frac{2}{-}$ | $\frac{3}{-}$ | 2 | 4 | |
| | | | | | | | | | | | | |

Kiudpilvituse sagedus (iga „—“ tähendab 5 registratsiooni). Arvutanud ja koostanud autor. Registratsioonid nagu eelmiselgi.

Aritmogramm-tabel XXX.

Variation annuelle de la fréquence des nuages en boules ou Cu (CiCu, ACu, Cu, FrCu, StCu). Chaque „—“ indique 10 enregistrements.

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|------|
| | | | | $\frac{4}{-}$ | $\frac{7}{-}$ | — | $\frac{5}{-}$ | $\frac{6}{-}$ | $\frac{1}{-}$ | | | |
| 4 | 4 | $\frac{3}{-}$ | $\frac{6}{-}$ | $\frac{-}{-}$ | $\frac{-}{-}$ | $\frac{-}{-}$ | $\frac{-}{-}$ | $\frac{-}{-}$ | $\frac{-}{-}$ | $\frac{2}{-}$ | 6 | |
| 4 | 4 | 13 | 26 | 44 | 47 | 50 | 45 | 56 | 41 | 22 | 6 | 1922 |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 16 | 7 | 9 | 27 | 29 | 39 | 41 | 46 | 35 | 20 | 12 | 4 | 1924 |
| $\frac{6}{-}$ | 7 | 9 | $\frac{-}{7}$ | $\frac{-}{9}$ | $\frac{-}{9}$ | $\frac{-}{-}$ | $\frac{-}{-}$ | $\frac{-}{-}$ | $\frac{-}{-}$ | $\frac{-}{2}$ | 4 | |
| | | | | | | | | | | | | |

Rünkpilvituse sagedus (valdavalt vinav taevakate, 2—8'). (Iga „—“ tähendab 10 registratsiooni.) Arvutanud ja koostanud autor.

Aritmogramm-tabel XXXI.

Variation annuelle de la fréquence des nuées de pluie et d'orage ou CuNb. Chaque „—“ indique deux enregistrements.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-----|----|---------------|---------------|-----|---------------|----|---|----|-----|------|
| | | | | $\frac{-}{-}$ | $\frac{-}{-}$ | — | $\frac{-}{-}$ | 1 | — | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1922 |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1924 |
| | | | | | | | | | | | | |

CuNb — äikesepilvituse sagedus (iga „—“ tähendab 2 registratsiooni). Arvutanud ja koostanud autor.

Seega valitseb talve-poolaastal (oktoober — märts) peamiselt mandritüüp pideva pilvitusest, mis levitab ihmjat valgust või valab sademeid ümbrusse. Suve-poolaastal domineerub sellevastu meretüüp katkise pilvitusest (Cu, Ci), levitades linnapildis suurt valguse ja varju vaheldust. Seda enam, et suvekuil on udu